



Javni zdravstveni zavod

Splošna bolnišnica Brežice

Moje zdravje.

Številka:

Datum: 08.03.2010

NAVODILA ZA OBVLADOVANJE KOLONIZACIJE / OKUŽBE Z ESBL+ entero bakterijami in VRE

1. Presejalne kužnine za odkrivanje ESBL+entero bakterij (Extended spectrum beta lactamases)

- bris rektuma;
- urin, če ima urinski kateter.

INDIKACIJE za odvzem:

- premestitev iz druge bolnišnice ali ustanove z zdravstveno ali socialno oskrbo (domovi starejših občanov, rehabilitacijski centri);
- premestitve med oddelki znotraj bolnišnice (če je bil bolnik na oddelku > 48 ur);
- ob sprejemu in odpustu v enoto intenzivne terapije (če je bil v enoti intenzivne terapije > 48 ur);
- pri bolniku, ki je hospitaliziran > 4 tedne ali prejema antibiotično terapijo > 3 tedne;
- če je bolnik > 48 ur soležeč v sobi z ESBL+ bolnikom;
- če gre za večkratno hospitalizacijo bolnika v zadnjih 3 letih;
- če je znana predhodna kolonizacija z ESBL+;
- bolnikom s kronično rano, preležanino, fistulo ali stomo;
- pred implantacijo vsadkov.

2. Presejalna kužnina za VRE (vankomicin rezistenten enterokok):

- blato.

INDIKACIJE za odvzem:

- če je bolnik premeščen iz UKC Ljubljana.

**Mojca Savnik Iskra, dr.med., specialist internist
PRESEDNICA KOBO**