

UKREPI ZA PREPREČEVANJE PRENOSA IN ŠIRJENJA CLOSTRIDIUM DIFFICILE

Različica 1.0



Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice
Moje zdravje.



Temos
Quality in Medical Care. Worldwide.



ACCREDITATION CANADA
INTERNATIONAL
Driving Quality Health Services

Številka: 4-40-261/14-24
Datum: 7.8.2014

UKREPI ZA PREPREČEVANJE PRENOSA IN ŠIRJENJA CLOSTRIDIUM DIFFICILE

Bakterija Clostridium difficile je eden najpomembnejših povzročiteljev okužb, povezanih z zdravstvom. Povzroča z antibiotikom povezan kolitis. Kar 90% psevdomembranoznih kolitisov povezujejo s Clostridium difficile.

Okužba se kaže z drisko, ki se pojavi nekaj dni do nekaj tednov po začetku jemanja antibiotika. Izvor okužbe je lahko endogen ali eksogen. Okužba se prenaša fekalno-oralno, za širjenje okužb so pomembne predvsem spore. Asimptomatski nosilci Clostridium difficile v veliki meri pripomorejo k hospitalnemu širjenju okužbe. Spore preživijo v okolju do pet mesecev.

UKREPI OB OKUŽBI:

1. V primeru potrjene okužbe s Clostridium difficile obvestiti ZOBO Splošne bolnišnice Brežice: Mojca Savnik Iskra, dr. med., spec. internist – št. mobilnega telefona: 051 659 878.
2. Potrebna je KONTAKTNA IZOLACIJA PACIENTA s prepoznano okužbo s Clostridium difficile. Pacient naj bo sam v sobi, uporablja naj svoje sanitarije, praviloma ne sme zapuščati sobe. Kadar je pacientov več, jih kohortno izoliramo.
3. Izolacija ni več potrebna 48h po prenehanju kliničnih težav oz. ko so iztrebki že formirani.
4. Vsi na oddelku (osebje, pacienti, obiskovalci) morajo upoštevati ukrepe za preprečevanje prenosa okužb s stikom.
5. Najpomembnejši ukrep je HIGIENA ROK, ki pri Clostridium difficile temelji na UMIVANJU ROK s toplo vodo in milom, s katerim odstranimo spore, šele nato sledi RAZKUŽEVANJE rok z alkoholnim razkužilom, s katerim uničimo vegetativne oblike Clostridium difficile.
6. Pri stiku s pacientom, njegovimi izločki, njegovim perilom ali s površinami v njegovi okolici je obvezna UPORABA ROKAVIC.
7. Za razkuževanje pacientove postelje, sobe in sanitarij razkuževanje z običajnimi razkužili ni uspešno, uporabiti je potrebno KLOROVE spojine ali VODIKOV PEROKSID.
8. OMEJIMO OBISKE pri pacientu.
9. Obveščanje zaposlenih in drugih oddelkov znotraj bolnišnice.
10. Izobraževanje uslužbencev.

UKREPI ZA PREPREČEVANJE PRENOSA IN ŠIRJENJA CLOSTRIDIUM DIFFICILE
Različica 1.0

11. V primeru izbruha *Clostridium difficile* ločimo osebje tako, da del osebja skrbi samo za paciente s *Clostridium difficile*, preostalo osebje pa za ostale paciente na oddelku. Skrajni ukrep v primeru neobvladanega izbruha *Clostridium difficile* je zaprtje oddelka, tako za sprejeme pacientov kot za obiskovalce.

Mojca SAVNIK ISKRA, dr.med., spec. internist
predsednica KOBO in ZOBO

Posredovati:

- strokovna direktorica;
- pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe;
- predstojniki oddelkov/namestniki;
- strokovne vodje/namestnice;
- drugi vodje notranjih organizacijskih enot/namestniki;
- objava na spletni strani;
- arhiv, KOBO.

